



آمار برداری خسارت چوبخوار در زمان برداشت

پروانه چوبخوار پسته


تعداد نسل در سال: یک نسل

فرم زمستان گذران: لارو درون شاخه های یک و دو ساله

بهترین و راحت ترین روش تخمین درصد آلودگی باغات پسته به آفت پروانه چوبخوار زمان برداشت محصول پسته است.



برای این منظور همزمان با برداشت از ردیف های مختلف یک باغ تقریباً ۲ هکتاری تعداد ۵۰۰ خوشه به طور تصادفی جدا نموده و درصد آلودگی را به دست آورید. بهتر است نمونه گیری از خوشه ها به صورت ۲۵ تایی و با ثبت موقعیت ردیف های مختلف باشد تا در صورت لزوم قطعات بدون آلودگی از سم پاشی حذف شوند.





آلوده را به دست آورید
در صورتیکه تعداد خوشه‌های آلوده به دست آمده
بیش از ۴,۰۰۰ خوشه بود، بایستی در زمان پیک
پرواز حشره بالغ در بهار، با مشورت متخصصین
، نسبت به مبارزه شیمیایی علیه آفت اقدام نمود.

برای دقیق‌تر شدن میزان آلودگی بهتر است
تعداد خوشه آلوده را محاسبه نمائید؛ به این
صورت که تناژ محصول برداشت شده را به گرم
تبدیل کنید و بر متوسط وزن تقریبی هر خوشه
پسته تر (۴۰ گرم) تقسیم نموده و تعداد خوشه

